

Demam Tifoid (Kepialu)

Sejenis jangkitan bawaan makanan disebabkan oleh bakteria *Salmonella typhi* (*S. typhi*)



Pembawa bakteria tifoid sukar dikesan dan tiada gejala demam tifoid.



Bakteria ini terdapat di dalam darah, urin dan najis pesakit juga najis pembawa.

Pembawa mengeluarkan bakteria tifoid di dalam najis menjangkiti orang lain.



Cara-cara Demam Tifoid Merebak

melalui makanan & minuman yang tercemar oleh najis manusia yang mengandungi bakteria *Salmonella typhi*

melalui makanan & minuman yang disediakan oleh pesakit dan pembawa bakteria tifoid

melalui hinggapan lalat yang membawa bakteria *Salmonella typhi*

melalui penggunaan bekalan air tercemar

Tanda-tanda dan Gejala

- Demam panas berpanjangan
- Sakit kepala
- Sakit badan / lemah / letih lesu
- Kurang selera makan
- Tidak sedarkan diri dan meracau
- Sembelit
- Cirit birit
- Sakit perut
- Mata layu dan cengkung
- Ruam (bintik merah pada bahagian atas badan)

Bahaya Demam Tifoid



Bahagian usus pesakit yang dijangkiti boleh pecah / bocor dan menyebabkan pendarahan.



Bakteria masuk ke sistem darah dan menyebabkan komplikasi di organ-organ lain selain usus.



Menyebabkan kematian jika tidak mendapat rawatan awal dan secukupnya.